

ENGELSKGRÆS

(*Armeria maritima*)

10-30 cm.
Blomstrer maj-september.
Linjeformede blade.
Blomst lilla/lyserød halvkugleformet.
Velduftende.
På saltholdig jord.
Almindelig i hele landet.
(Hindebægerfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Therese Nissen

HARRIL

(*Juncus gerardii*)

20-50 cm.
Blomstrer juli-august.
Står i klynger/grupper.
Cylindrisk stængel og rendeformede blade.
På våd lerjord.
Meget almindelig i hele landet.
(Sivfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

HINDEBÆGER

(*Limonium sp.*)

10-30 cm.
Blomstrer juli-september.
Stængel ofte grenet fra over midten.
Blomsterstand tæt med 6-8 (2-3) blomsterstande.
På våd, dyndl bund.
Temeleg sjælden, kendt på Øerne (- Bornholm).
(Hindebægerfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Biopix

JORDBÆR-KLØVER

(*Trifolium fragiferum*)

10-30 cm.
Blomstrer juli-august.
Rødlig blomsterstængle.
Blomster lyserøde, bæger op-pustet efter afblomstring.
Blade glatte og fint savtakkede, kan have svag, rød v-formet af-tegning.
På fugtig, salt- og næringsrig bund.
Almindelig i hele landet.
(Ærteblomstfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

FLORATJEK

STRAND-ENG

Karakteristiske og let kendelige positivarter

KVELLER/SALTURT

(Salicornia europaea)

5-30 cm.
Blomstrer august-september.
Nedliggende, opstigende eller opret sukkulent.
Til tider stærkt grenede stængler.
På saltpåvirkede arealer.
Almindelig i hele landet.
(Salturfamilien)



Foto: Carsten Juel



Foto: Carsten Juel

STRAND-ASTERS

(Aster tripolium)

15-60 cm.
Blomstrer juni-september.
Blomsten har blåviolet randkrone og gul skivekrone.
På våd bund.
Almindelig ved kysterne, sjældent i indland.
(Kurvefamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

STRAND-KOGLEAKS

(Bolboschoenus maritimus)

30-110 cm.
Blomstrer juli-august.
Stængel skarpt 3-kantet.
Danner tætte bestande.
På dyndbund/strandørsump.
Almindelig langs kysterne i hele landet.
(Halvgræsfamilien)



Foto: Biopix

STRAND-MALURT

(Artemisia maritima)

15-60 cm.
Blomstrer august-september.
Urt-halvbusk.
Danner tætte bestande.
Grå-hvidfiltet overalt, stærkt aromatisk duft.
Blomst grønlig-rødgul.
På næringsrig, stenet bund.
Spredt ved de indre farvande og langs den jyske vestkyst.
(Kurvblomstfamilien)



Foto: Biopix



Foto: Ib Nord Nielsen

FLORATJEK

STRAND-ENG

Karakteristiske og let kendelige positivarter

STRAND-TREHAGE

(*Triglochin maritimum*)

15-80 cm.
Blomstrer juni-august.
Korte jordstængler.
Tueformet.
På våd-fugtig bund.
Almindelig i hele landet ved beskyttede kyster. Sjældent inde i landet.
(Trehagefamilien)



Foto: Kirsten Andersen



Foto: Jens Christian Schou

STRAND-VEJBRED

(*Plantago maritima*)

10-30 cm.
Blomstrer juli-september.
Blade i roset, grågrønne, linjeformede, kødfulde, glatte blade – ofte sortplettede.
Blomster sidder i 3-7 cm lange aks.
Støvknapper kraftigt gule.
På grus eller lerjord.
Meget almindelig overalt i landet.
(Vejbredfamilien)



Foto: Ib Nord Nielsen



Foto: Jens Christian Schou

TUSINDGYLDEN

(*Centaurium sp.*)

5-30 cm.
Blomstrer juli-september.
Blade sidder i roset, stængel få-grenet.
Blomst lille violet.
På fugtig bund (åben, leret/sandet bund)
Spredt i hele landet i kystnære områder (sjældent indland).
(Ensfianfamilien)



Foto: Lene Kjær Hansen



Foto: Lene Kjær Hansen