

FLORATJEK

GØGEURT

(*Dactylorhiza sp.*)

7-65 cm.
Blomstrer maj-juli.
Glat stængel.
Blomster hvidlige-, lysviolette-, rød-
violette- eller rødlilla (til tider bleg-
gule) – oftest med mørke aftegnin-
ger på største blomsterblad.
På kalkrige jorde.
Sjældnen i Himmerland, Vest- og Øst-
jylland – Spredt i resten af landet.
(Gøgeurtfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Therese Nissen

VIOL

(*Viola sp.*)

5-20 cm.
Blomstrer maj.
Krybende jordstængel.
Blade siddende i få-bladet roset,
næsten helt glatte.
Blomst bleg rødviollet/blålig med
mørke årer.
På fugtig bund.
Spredt i hele landet.
(Violfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Jens Christian Schou

DJÆVELSBID

(*Succisa pratensis*)

25-60 cm.
Blomstrer august-september.
Blomst blå (sjældent rødviollet/hvid),
halvkugleformet.
På fugtig, ofte næringsfattig bund.
Almindelig i hele landet.
(Kartebollefamilien)



Foto: Jan Pedersen

ENGBLOMME

(*Trollius europaeus*)

20-70 cm.
Blomstrer maj-juni.
Blomst gul og næsten kuglefor-
met.
På fugtig, næringsrig bund.
Temeleg sjældnen, spredt i
Jylland, Fyn og Sjælland – i øvrigt
sjældnen.
(Ranunkelfamilien)



Foto: Biopix



Foto: Biopix



FLORATJEK

ENG/SUMP-FORGLEMMIGEJ

(*Myosotis palustris/ laxa*)

15-40 cm.
Blomstrer juni-august.
Håret på blade og stængel.
Stængel opret.
Knop lyserød – efter udspringning blå med gul bikrone.
På fugtig-våd muldbund/næringsrig bund.
Almindelig i hele landet (- Læsø).
(Rubladfamilien)



Foto: Rume Larsen



Foto: Rume Larsen

ENG-KABBELEJE

(*Caltha palustris*)

15-30 cm.
Blomstrer maj-juni.
Blade hjerte/nyreformede savtakke-ede, glinsende.
Blomst solgul.
På fugtig bund.
Almindelig i størstedelen af landet.
(Ranunkelfamilien)



Foto: Gerner Jensen



Foto: Gerner Jensen

ENG/SUMPKARSE

(*Cardamine pratensis/pratensis ssp. paludosa*)

20-40 cm.
Blomstrer maj-juni.
Lodret jordstængel med sideskud.
Stængel cylindrisk og hul.
Blomst hvid-lysviolet.
På tør til fugtig bund.
Almindelig i det meste af landet.
(Korsblomstfamilien)



Foto: Biopix



Foto: Biopix

ENG-NELLIKEROD

(*Geum rivale*)

20-30 cm.
Blomstrer maj-juni.
Blomst gul-rød, nikkende, klokkeformet.
Stængel rødbrun, småhåret.
På fugtig næringsrig bund.
Almindelig i hele landet.
(Rosenfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Therese Nissen

FLORATJEK

HJERTEGRÆS

(*Briza media*)

30-45 cm.
Blomstrer juni-juli.
Løst tueformet.
På tør-fugtig, åben kalkfattig, leret bund, især på skrænter.
Temmelig almindelig i hele landet.
(Græsfamilien)



Foto: Therese Nissen

KRAGEFOD

(*Potentilla palustris*)

30-80 cm.
Blomstrer juni-august.
Vokser langs jorden og har opstigende stængel.
Blomster sidder sammen 2-3 stk. På fugtig bund.
Almindelig i Jylland og Nordøst-sjælland. Ellers spredt i landet.
(Rosenfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Carsten Juel

KÆR-SVOVLROD

(*Peucedanum palustre*)

80-180 cm.
Blomstrer juli-august.
Stængel hul, glat, forneden rødlig.
Blomster hvidlige (sjældent rødlig).
På fugtig-våd, mager bund.
Almindelig i Østjylland og på Øerne.
Spredt i Nord- og Vestjylland.
(Rosenfamilien)

NB: ved tvivl med andre skærmpflanter undlad at krydse af.



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Biopix

KÆR-TIDSEL

(*Cirsium palustre*)

80-150 cm.
Blomstrer juli-august.
Blomst rødviolet.
Stængel slank, rødlig-mørkerød.
Hele planten tæt besat af torne.
Blade i roset - mørkegrøn overside, bleggrøn, håret underside.
På fugtig bund.
Temmelig almindelig i hele landet.
(Kurveblomstfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Biopix



FLORATJEK

TORMENTIL

(*Potentilla erecta*)

10-30 cm.

Blomstrer juni-august.

Blade siddende omkring stængelen.

Blomst gul med 4 kronblade.

På fugtig-våd, mager, gerne tørverig bund.

Almindelig i hele landet.

(Rosenfamilien)

FERSK-ENG

Karakteristiske og let kendelige positivarter



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

TRÆVLEKRONE

(*Lychnis flos-cuculi*)

20-50 cm.

Blomstrer juni-juli.

Blomst lilla/blåviolet, let genkendelig med slidsede blade.

På fugtig bund.

Temmelig almindelig i hele landet.

(Nellikefamilien)



Foto: Joakim Engel