

FLORATJEK

VISSE

(*Genista sp.*)

10-40 cm.

Blomstrer maj-juni.

Halvbusk med grentorne (Engelsk-Visse) (Håret- eller Farve-Visse: uden torne), (Håret-Visse: hårede grene og underside af blade. Farve-Visse: glatte eller randhårede blade).

På tør, åben, mager bund.

Temmelig almindelig i Midt- og Vestjylland, spredt i resten af Jylland og på Fyn, ellers manglende.

NB: Kan forveksles med Gyvel.

Visse er dog langt mindre.

(Ærteblomstfamilien)

HEDE

Karakteristiske og let kendelige positivarter



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

BLÅBÆR

(*Vaccinium myrtillus*)

15-45 cm, dværgbusk.

Blomstrer maj-juni.

Grønne, kantede grene. Blade savtakke, frisk grøn over/underside. Blomster grønlig-rød, enkeltvise, kugleformet. **Bær violet frugtkød.** (Mose-bølle: Brune grene. Frugtkød hvidt).

På fugtig mager bund.

Almindelig i Jylland, sjældent i resten af landet.

(Lyngfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Jens Christian Schou

BLÅMUNKE

(*Jasione montana*)

5-50 cm.

Blomstrer i juli-september.

Flere, opstigende, ofte grenede stængler.

Blade bølgede, stivhårede.

På mager, lysåben bund, især nær kysten.

Almindelig i hele landet (- sydlige øer).

(Klokkefamilien)

NB: Kan forveksles med Djævelsbid, Blåhar og Ska-biose sp. Disse er også positivarter.



Foto: Per Thomassen



Foto: Kirsten Damgaard

DJÆVELSBID

(*Succisa pratensis*)

25-60 cm.

Blomstrer august-september.

Blomst blå (sjældent rødviolet/hvid), halvkugleformet.

På fugtig, ofte næringsfattig bund.

Almindelig i hele landet.

(Kartebollefamilien)

NB: Kan forveksles med Djævelsbid, Blåhar og Ska-biose sp. Disse er også positivarter.



Foto: Jan Pedersen



FLORATJEK

HEDE

Karakteristiske og let kendelige positivarter

GULDBLOMME

(*Arnica montana*)

30-60 cm.

Blomstrer juni-juli.

Blade siddende i roset.

Blomster/kurvne orangegul, 5-7

cm bred.

På mager, åben, kalkfattig, sandet eller humusbund.

Spredt i Jylland, sjælden i øvrige Danmark (- Lolland-Falster og Bornholm).

FREDET.

(Kurvblomstfamilien)



Foto: Hans Ølgaard.



Foto: Jens A. Christiansen.

HEDELYNG

(*Calluna vulgaris*)

15-75 cm.

Blomstrer august-september.

Stedsegrøn dværgbush.

Blomster rosa.

På tør åben, mager bund.

Meget almindelig i hele landet.

(Lyngfamilien)



Foto: Charlotte Rosenblad Ralund



Foto: Charlotte Rosenblad Ralund

HEDE-MELBÆRRIS

(*Arctostaphylos uva-ursi*)

5-15 cm.

Blomstrer maj-juni.

Dværgbush, stedsegrøn.

Blade tydeligt netformet mønster på underside.

Blomster hvide-blegrosa, krukkeformede, endestillede.

På tør, åben, sandet/gruset bund.

Temmelig almindelig i Vest- og Nordjylland, i øvrigt kun i Nordsjælland.

(Lyngfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

KLOKKELYNG

(*Erica tetralix*)

10-25 cm.

Blomstrer juli-august.

Stedsegrøn, dværgbush.

Blomst rosa, klokkeformet.

Nåleformede blade der sidder i en 4-bladet krans om stænglen.

På fugtig sandet eller tørvebund.

Almindelig i Vest- og Nordjylland, også på Sjælland.

(Lyngfamilien)



Foto: Kirsten Andersen.



Foto: Emil Lütken.



FLORATJEK

LAV SKORSONER

(*Scorzonera humilis*)

10-40 cm.
Blomstrer maj-juni.
Med mælkesaft.
Blomst gul 5-6 cm bred- ydre
kronblade
meget lange.
Blade tydeligt siddende i roset,
strenget.
På fugtig-tør bund.
Temeleg sjælden i Vestjylland, i
øvrigt sjælden.

(Kurvblomstfamilien)

HEDE

Karakteristiske og let kendelige positivarter



Foto: Per Thomassen.



Foto: Kirsten Andersen.

LYNG-SNERRE

(*Galium saxatile*)

15-35 cm.
Blomstrer juni-juli.
Tæppedannende.
Blade oftest siddende i krans om
stænglen (6-bladt krans).
Blomst hvid, sorte frugter efter
afblomstring.
På tør, mager, åben bund.
Temeleg almindelig i hele landet.

(Krapfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

MOSE-BØLLE

(*Vaccinium uliginosum*)

10-80 cm, busk.
Blomstrer maj-juni.
Blade mørkegrøn overside, blågrøn
underside. **Grene brune.**
Blomster enkeltvis, hvid-blegrøde,
krukkeformede. **Bær lyst frugtkød.**
På fugtig, mager tørvebund.
(Blåbær: grønne grene,
frugtkød violet.)
Almindelig i Vest- og Nordjylland,
sjælden i resten af landet.
(Lyngfamilien)



Foto: Per Thomassen.

MOSE-PORS

(*Myrica gale*)

1-1,5 m høj busk.
Blomstrer marts-april/maj.
Aromatisk duft.
5-15 mm lange rakler (grøn ->
røde).
På fugtig, mager bund.
Almindelig i Vest-, Midt- og Nord-
jylland, ellers spredt i landet.
(Porsfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Kristian Overgaard



FLORATJEK

REVLING

(*Empetrum nigrum*)

10-30 cm.
Blomstrer marts-april.
Dværgbusk, stedsegrøn.
Blade tætstillede, græsgrønne.
Hvidlig stribe på bladunderside.
Uanselige blomster.
Frukt sortrød, kødfuld med sten.
På tør-fugtig, åben, mager bund.
Meget almindelig i Nord- og Vestjylland. Spredt i resten af landet.
(Lyngfamilien)



Foto: Ib Nord Nielsen



Foto: Jens Christiansen Schou

ROSMARINLYNG

(*Andromeda polifolia*)

10-30 cm.
Blomstrer juni-juli.
Stedsegrøn, dværgbusk.
Blomst rosa, krukkeformet, endestillet på stilk.
Blade spredte, lancetformede, mørkegrønne – sølvgrå og glat underside.
Sjældnen, flere steder i Jylland.
(Lyngfamilien)



Foto: Torben Nielsen



Foto: Torben Nielsen

ALMINDELIG SANDSKÆG

(*Corynephorus canescens*)

10-20 cm.
Blomstrer juli-august.
Tueformet.
Grågrønne, sammenlagte blade.
Bladskeder vinrøde.
På tør, åben sandbund.
Kendt fra hele landet, almindelig i Jylland, spredt på Øerne (- Ærø).
(Græsfamilien)



Foto: Gerner Jensen



Foto: Gerner Jensen

TORMENTIL

(*Potentilla erecta*)

10-30 cm.
Blomstrer juni-august.
Blade siddende omkring stænglen.
Blomst gul med 4 kronblade.
På fugtig-våd, mager, gerne tørverig bund.
Almindelig i hele landet.
(Rosenfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou



TRANEBÆR

(*Vaccinium oxycoccus*)

4-8 cm.

Blomstrer juni-juli.

Spinkel, stedsegrøn.

Overfladiske, krybende, trådtynde grene.

Blomster lyserøde/røde, siddende enkeltvise.

Røde sure bær, sidder enkeltvis.

Almindelig i Vest- og Nordjylland, sjældent i resten af landet.

(Lyngfamilien)



Foto: Frank Overgaard Nielsen



Foto: Frank Overgaard Nielsen

TYTTEBÆR

(*Vaccinium vitis-idaea*)

5-25 cm.

Blomstrer maj-juni.

Dværgbusk, stedsegrøn, tæppedannende.

Blade glinsende, mørkegrøn overside, underside mat bleggøn.

Blomster hvide eller lyserøde, krukkeformede, siddende få sammen.

Bær hvide -> røde.

På tør-fugtig, mager bund.

Almindelig i Vest- og Nordjylland, sjældent i resten af landet.

(Lyngfamilien)



Foto: Hans Ølgaard



Foto: Hans Ølgaard