

FLORATJEK

KALKRIG MOSE

Karakteristiske og let kendelige positivarter

GØGEURT

(*Dactylorhiza sp.*)

7-65 cm.

Blomstrer maj-juli.

Glat stængel.

Blomster hvidlige-, lysviolette-, rød-violette- eller rødlig (til tider bleg-gule) – oftest med mørke aftegninger på største blomsterblad.

På kalkrige jorde.

Sjældnen i Himmerland, Vest- og Østjylland – Spredt i resten af landet.

(Gøgeurfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Therese Nissen

SKJALLER

(*Rhinanthus sp.*)

10-40 cm.

Blomstrer maj-august.

Stængel glat, opret, **4-kantet**, brunstreget.

Blade siddende modsat hinanden, ustilkede, savtakkede.

Blomst gul, siddende i endestillet klase – til tider med et mindre blå-violet mærke på blomsten.

På fugtig bund.

Spredt i hele landet.

(Læbeblomstfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Therese Nissen

TROLDURT

(*Pedicularis sp.*)

5-15 cm.

Blomstrer maj-juni.

Blomster lys rødlig, siddende i fåblomstret aks.

På fugtig, mager bund.

Almindelig i Vest- og Nordjylland, spredt i Østjylland og Bornholm.

Meget sjældnen i resten af landet.

(Maskeblomstfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

HVAS AVNEKNIPPE

(*Cladium mariscus*)

75 til 200 cm.

Blomstrer i juli-august.

Danner store bevoksninger.

Strå hul, foroven 3-kantet.

Blade skarpt savtaktede i randen.

På våd, kalkrig dyndbund.

Meget sjældnen i Østjylland, sjældnen i resten af landet.

(Halvgræsfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou



FLORATJEK

DJÆVELSBID

(*Succisa pratensis*)

25-60 cm.
Blomstrer august-september.
Blomst blå (sjældent rødviolet/
hvid), halvkugleformet.
På fugtig, ofte næringsfattig
bund.
Almindelig i hele landet.
(Kartebollefamilien)



Foto: Jan Pedersen

HJERTEGRÆS

(*Briza media*)

30-45 cm.
Blomstrer juni-juli.
Løst tueformet.
På tør-fugtig, åben kalkfattig,
leret bund, især på skrænter.
Temmelig almindelig i hele landet.
(Græsfamilien)



Foto: Therese Nissen

KÆR-TREHAGE

(*Triglochin palustre*)

15-40 cm.
Blomstrer juni-juli.
Stængel 1 mm tyk, spinkel.
Blade 1-2 mm brede, bløde,
kødede.
På våd-fugtig, næringsrig bund.
Almindelig i hele landet.
(Trehagefamilien)



Foto: Biopix



Foto: Jens Christian Schou

LEVERURT

(*Parnassia palustris*)

15-25 cm.
Blomstrer juli-september.
Blade nyre-hjerteformede i roset.
Stængel glat.
**Blomst let genkendelig med fem
store, hvide, "årede" kronblade.**
På åben, fugtig-våd bund.
Sjælden i hele landet.
(Leverurtfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Jan Pedersen



SUMP-HULLÆBE

(*Epipactis palustris*)

15-40 cm.
Blomstrer i juli.
Blomsterstand med 4-15 blomster.
Blomst hvidlig, største blomsterblad med røde og gule tegninger.
På fugtig, kalkrig bund.
Spredt i Nordvestjylland, sjælden på Fyn, Lolland og Østjylland, meget sjælden i resten af landet.

FREDET

(Gøgeurtfamilien)



Foto: Biopix



Foto: Antje Neumann

TORMENTIL

(*Potentilla erecta*)

10-30 cm.
Blomstrer juni-august.
Blade siddende omkring stænglen.
Blomst gul med 4 kronblade.
På fugtig-våd, mager, gerne tørverig bund.
Almindelig i hele landet.
(Rosenfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

TVEBO BALDRIAN

(*Valeriana dioica*)

10-40 cm.
Blomstrer maj-juni.
Blomst hvid-rødlig.
Hanlige blomsterhoveder 4 cm brede, hunlige 1-2 cm brede.
Lange underjordiske udløbere.
På fugtig-våd, oftest kalkrig bund.
Spredt i det meste af landet – sjælden i Nordjylland.
(Baldrianfamilien)



Foto: Biopix



Foto: Jens Christian Schou

VIBEFEDT

(*Pinguicula vulgaris*)

7-18 cm.
Blomstrer maj-juli.
Blade i roset, klæbrige, skinnende, lysegrønne.
Blomst blåviolet. Blomsterstilk kirtelhåret og klæbrig.
Køddædende.
På fugtig-våd, åben, sand- eller tørvebund.
Sjælden på Sjælland og Lolland-Falster. Spredt i resten af landet.
(Blærerodfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Therese Nissen