

FLORATJEK

KNOPURT

(*Centaurea sp.*)

20-100 cm.
Blomstrer juli-september.
Stængel grenet.
Blomst rødviolet/mørk rødviolet.
Blade mørkegrønne, grågrønne, ru.
På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund).
Almindelig i hele landet.
(Kurvblomstfamilien)



Foto: Allan Andersen.



Foto: Carsten Juel

SKJALLER

(*Rhinanthus sp.*)

10-40 cm.
Blomstrer maj-august.
Stængel glat, opret, **4-kantet**, brunstreget.
Blade siddende modsat hinanden, ustilkede, savtakke.
Blomst gul, siddende i endestillet klase – til tider med et mindre blåviolet mærke på blomsten.
På fugtig bund.
Spredt i hele landet.
(Læbeblomstfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Therese Nissen.

TIMIAN

(*Thymus sp.*)

5-25 cm, dværgbusk.
Blomstrer juli-august.
Håret stængel, **mere el. mindre 4-kantet**.
Stærk aromatisk duft.
Blomst rødlig/lilla.
Tør, åben, sandet eller grusbund.
Almindelig i det meste af Jylland, Nordsjælland og Bornholm.
(Læbeblomstfamilien)



Foto: Carsten Juel



Foto: Therese Nissen

VIOL

(*Viola sp.*)

5-20 cm.
Blomstrer maj.
Krybende jordstængel.
Næsten helt glatte blade i fåbladet roset.
Blomst bleg rødviolet/blålig med mørke årer.
På fugtig bund.
Spredt i hele landet.
(Violfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Jens Christian Schou



FLORATJEK

BAKKE-NELLIKE

(*Dianthus deltooides*)

10-20 cm.
Blomstrer juni-august.
Nedliggende til opstigende stængel.
Blomst rødlig med en mørk ring.
inders på bladene.
Kronblade tandende.
Tør, kalkfattig, sandet bund.
Almindelig i hele landet (- Anholt).
(Nellikfamilien)



Foto: Anders Juel



Foto: Anders Juel

DJÆVELSBID

(*Succisa pratensis*)

25-60 cm.
Blomstrer august-september.
Blomst blå (sjældent rødviolet/
hvid), halvkugleformet.
Fugtig, ofte næringsrig bund.
Almindelig i hele landet.
(Kartebollefamilien)

NB: Kan forveksles med Blåhat, Skabiose
sp. eller Blåmunke. Disse arter er også posi-
tivarter.



Foto: Jan Pedersen

VELLUGTENDE GULAKS

(*Anthoxanthum odoratum*)

10-40 cm.
Blomstrer maj-juni.
Tueformende.
Blomsterstand er en dusk.
Dufter af kumarin (duften af
nyslået h ).
T r fugtig bund.
Meget almindelig i hele landet.
(Gr sfamilien)



Foto: Tom Smidth



Foto: Hans  lgaard

GUL EVIGHEDSBLOMST

(*Helichrysum arenarium*)

15-30 cm.
Blomstrer juli-september.
Blade gr filtet, smalle, tiltrykte op
af st nglen.
Blomster sidder i t tte stande,
kraftig gul-orange.
P  t r,  ben mager bund.
Spredt p   erne, Djursland og
Midtjylland - i  vrigt sj lden.
(Kurvblomstfamilien)



Foto: Carsten Juel



Foto: Carsten Juel



FLORATJEK

OVERDREV

Karakteristiske og let kendelige positivarter

GUL SNERRE

(*Galium verum*)

10-60 cm.
Blomstrer juli-august.
Blade smalle, sidder i krans om stænglen.
Blomster meget små, gule og velduftende.
Tør, åben og mager bund.
Almindelig i hele landet.
(Krapfamilien)



Foto: Hans Øllegaard



Foto: Hans Øllegaard

HEDELYNG

(*Calluna vulgaris*)

15-75 cm.
Blomstrer august-september.
Stedsegrøn dværgbush.
Blomster rosa.
På tør åben, mager bund.
Meget almindelig i hele landet.
(Lyngfamilien)



Foto: Charlotte Rosenblad Ralund



Foto: Charlotte Rosenblad Ralund

HJERTEGRÆS

(*Briza media*)

30-45 cm.
Blomstrer juni-juli.
Løst tueformet.
Tør-fugtig, åben kalkfattig, leret bund, især på skrænter.
Tæmmelig almindelig i hele landet.
(Græsfamilien)



Foto: Therese Nissen

HULKRAVET KODRIVER

(*Primula veris*)

10-30 cm.
Blomstrer april-maj.
Blade dunhåret, siddende i roset.
Blomst gul med orange pletter inderst på bladene – vellugtende.
På næringsrig bund.
Almindelig på Øerne, Øst- og Nordjylland, sjældent i resten af landet.
(Kodriverfamilien)



Foto: Therese Nissen



Foto: Jan Pedersen



FLORATJEK

HÅRET HØGEURT

(*Pilosella officinarum*)

5-30 cm.
Blomstrer maj-juni
Blade i roset, med udløbere.
Blade spredt langhårede på oversiden, bladunderside tæt hvidfiltet.
Tæppedannende.
Blomst gul.
På tør og sandet bund.
Almindelig i hele landet.
(Kurvblomstfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

KNOLDET MJØDURT

(*Filipendula vulgaris*)

50-70 cm.
Blomstrer maj-juni.
Groft tandede blade.
Dufter svagt aromatisk.
Blomst hvid-flødefarvet (til tider rødlig).
På tør, åben, sandet, kalkrig bund.
Spredt i Danmark
(- Vestjylland).
(Rosenfamilien)



Foto: Poul Ewald Hansen



Foto: Poul Ewald Hansen

KORNET STENBRÆK

(*Saxifrage granulata*)

15-25 cm.
Blomstrer maj-juni.
Blade siddende i roset - langstilkede, nyreformede, rundtandede.
Blomster hvide.
På tør, sandet bund.
Almindelig i hele landet.
(Stenbrækfamilien)



Foto: Poul Ewald Hansen



Foto: Poul Ewald Hansen

LAV TIDSEL

(*Cirsium acaule*)

10-30 cm.
Blomstrer juli-september.
Blade roset stillede, aflange ofte skinnende med stive, stikkende torne.
På kalkrig bund, især nordvendte skrænter.
Spredt i landet
(- i Vest- og Sydjylland).
(Kurvblomstfamilien)



Foto: Hans Wejnberg

Foto: Kresten Hansen



FLORATJEK

OVERDREV

Karakteristiske og let kendelige positivarter

LIDEN KLOKKE

(*Campanula rotundifolia*)

10-40 cm.
Blomstrer juli-september.
Stængel glat, spinkel, opstigende.
Stængelblade smalle, tilspidsede.
Blomst blå-blållilla.
På tør, sandet eller leret bund.
Almindelig i hele landet.
(Klokkefamilien)



Foto: Kirsten Damgaard

LYNG-SNERRE

(*Galium saxatile*)

10-30 cm.
Blomstrer juni-juli
Tueformet, tæppedannende.
Blade smalle, siddende i 6-bladet krans om stænglen.
Blomst hvid, sorte frugter efter afblomstring.
På tør, mager, åben bund.
Temmelig almindelig i hele landet.
(Krapfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

LÆGE-ÆRENPRIS

(*Veronica officinalis*)

5-30 cm.
Blomstrer juli-august.
Stængel håret, krybende til opret.
Blade modsatte, ægformede, håret og fint savtaktede.
Blomst med 4 kronblade, blålig/blållilla/blegblå.
Tør, mager, humusrig bund.
Almindelig i det meste af landet.
(Maskeblomstfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

ALMINDELIG MERIAN

(*Origanum vulgare*)

20-70 cm.
Blomstrer juli-september.
Blade næsten glatte, tydeligt prikkede. Velduftende.
Blomster i bundter - rosa (sj. hvidl).
Stængel spinkel, håret, rødlig.
På tør kalkholdig bund.
Almindelig på Sjælland, spredt på Fyn, Bornholm, Nord- og Østjylland, sjældent i Vestjylland.
(Læbeblomstfamilien)



Foto: Carsten Juel



Foto: Carsten Juel

FLORATJEK

MÆLKEURT

(*Polygala sp.*)

10-20 cm.
Blomstrer juli-august.
Blomster blå-rødviolette, sjældent bleg rosa eller hvidlige.
Blomsterstand med 10-40 blomster.
Stængel ugrenet.
På tør-fugtig, åben, kalkfattig, sandet eller humusrig bund.
Almindelig i Vestjylland, ellers spredt i hele landet.
(Mælkeurtfamilien)



Foto: Biopix



Foto: Biopix

NIKKENDE KOBJÆLDE

(*Pulsatilla pratensis*)

8-20 cm.
Blomstrer april-maj.
Hele planten tæt håret, blade i basal roset.
Blomst enlig, nikkende, klokkeformet, mørkviolet.
På tør og sandet bund.
Spredt i Nord- og Østjylland og på Øerne (- Lolland og Falster).
(Ranunkelfamilien)



Foto: Carsten Juel



Foto: Allan Andersen

TJÆRENELLIKE

(*Viscaria vulgaris*)

15-50 cm.
Blomstrer maj-juli.
Stængel rødbrun med **klæbrige områder**.
Blade ved basis med sammenfil-trede, hvide hår.
Blomster rosa, samlet i en tæt-blomstret, klaselignende top.
På tør kalkfattig bund.
Sjælden i Vestjylland og Lolland Falster. Spredt i resten af landet.
(Nellikefamilien)



Foto: Søren Tolsgaard



Foto: Jens Christian Schou

TORMENTIL

(*Potentilla erecta*)

10-30 cm.
Blomstrer juni-august.
Blade siddende omkring stænglen.
Blomst gul med 4 kronblade.
På fugtig-våd, mager, gerne tørve-rig bund.
Almindelig i hele landet.
(Rosenfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Christian Schou

